

# METEOR PFnPE

Insetticida in sospensione concentrata

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)

Coformulanti q.b.a g 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**

**REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

## TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.

Via Tonale 15

ALBANO S. ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

## OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA

CARAVAGGIO (BG)

## DISTRIBUITO DA

DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG) Tel. 0363 355611

COPYR S.p.A. - via Stephenson 29 - 20157 Milano Tel. 02 390368.1

KOLLANT S.R.L. - via C. Colombo 7/7 A -30030 Vigonovo (VE) Tel. 049 9983001

NEWPHARM HOME & GARDEN S.r.l. - Via dell'Artigianato, 22 - 35010 Santa Giustina in Colle (PD)

Tel. +39 049 9303165

GREEN RAVENNA SRL - Via dell'Artigianato, 21 - 48033 Cotignola (RA) - Tel. 0545 908980

## Registrazione Ministero della Sanità n. 10976 del 12/7/2001


Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/10/2019; nel caso di concessione di proroghe della scadenza del prodotto, suddetta validità non potrà comunque superare il 02/05/2020

**QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 1-10-30-50-60-100-200-250-500**

**PARTITA N.**

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

**Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Per la protezione degli organismi acquatici applicare le misure previste alla voce "Avvertenza". Il prodotto è nocivo per api e insetti utili. Non trattare durante la fioritura.**



**ATTENZIONE**

## ETICHETTA USO NON PROFESSIONALE

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea. Reazioni allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro antiveleni**

### CARATTERISTICHE

METEOR è un insetticida piretroide in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione. Risulta dotato di un ampio spettro di azione insetticida e manifesta ottima capacità di protezione delle colture anche a basse temperature. L'effetto repellente ne prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfestazione.

### MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Le dosi riportate in ml/hl si riferiscono a trattamenti a "volume normale": per trattamenti a basso o ultra-basso volume aumentare proporzionalmente le dosi, per garantire la stessa quantità di prodotto ad ha. Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in interventi precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse.

Numero massimo di trattamenti ed intervallo d'intervento (salvo diversa indicazione per singola coltura): N. 3 ogni 7-14 giorni.

METEOR si impiega alle dosi indicate sulle seguenti colture e contro i seguenti fitofagi:

**AGRUMI** (1 solo trattamento): contro Afidi e Mosca degli agrumi, Aleurodidi, Cocciniglie: 70-87 ml/hl.

**FRUTTIFERI (Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino):** su Ciliegio e Susino 3 trattamenti ogni 14 giorni:

- contro neanidi di Cocciniglia S. Josè in trattamenti estivi, Psilla, Cidia e Anarsia: 90 ml/hl.

- contro Carpocapsa: 60 ml/hl.

- contro Capua, Cacoecia, Microlepidotteri minori di melo e pero, Anomalo, Maggiolini, Tentredine: 60-90 ml/hl.

- contro Afide verde del melo, Afidi del pesco, Tripidi e Mosca della frutta: 70-90 ml/hl.

- contro *Aromia bungii* di Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino: 60-90 ml/hl. In interventi localizzati al tronco: 200 ml/hl.

**MANDORLO** (3 trattamenti ogni 14 giorni): - contro Afidi (*Myzus p.*, *Hyalopterus pruni*), Cidia e Anomalo (*Anthonomus amygdali*): 70-87 ml/hl.

**VITE:** contro Cicaline, Tignole, Afidi, Sigaraio, Nottue, Piralide: 70-90 ml/hl.

**OLIVO (da olio e da tavola):** contro Mosca dell'olivo, Tignola dell'olivo, Cocciniglia m. g. di pepe, Tripide: 80-90 ml/hl (Olivo da Olio 3 trattamenti ogni 14 giorni)

**ORTAGGI in campo (e serra dove specificato):**

- **CARCIOFO, CAVOLI A INFIORESCENZA (broccoli e cavolfiori), C. CAPPUCCIO, CETRIOLO (in campo ed in serra), FAGIOLINO, FAGIOLINO, FAVA, FRAGOLA (in campo ed in serra), LATTUGHE E INSALATE (escluso scarola/indivia a foglie larghe e baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia), MELANZANA (in campo ed in serra), PATATA, PISELLO, PORRO, POMODORO (in serra), PEPERONE, RUCOLA, FOGLIE DI SEDANO, ZUCCHINO (in campo ed in serra), ZUCCA (in campo ed in serra):** 3 trattamenti ogni 7-14 giorni;

- **C. DI BRUXELLES** massimo 2 trattamenti ogni 7 giorni;

- **CAROTA, POMODORO (in campo), MELONE, CIPOLLA, AGLIO:** 3 trattamenti ogni 14 giorni;

- contro Altiche, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Tentredini, Tripidi: 60-70 ml/hl;

- contro Afidi, Aleurodidi, Casside, Cimici, Criocera, Depressaria, Mosca, Piralide, Cavallette: 80-90 ml/hl.

**FRUMENTO** (3 trattamenti ogni 14 giorni), **ORZO, MAIS:** contro Piralide, Diabrotica del mais, Afidi, Cimici, Nottue, Tripidi: 0,6-0,8 l/ha.

**FLOREALI:** in campo contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cetonie, Maggiolino, Tortricidi: 80-90 ml/hl.

**ORNAMENTALI:** in campo contro Afidi, Tingide, Cimice del Platano, Maggiolino, Cetonie, larve di lepidotteri: 80-90 ml/hl.

**COMPATIBILITA'** - Il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**AVVERTENZA:** per i trattamenti in pieno campo rispettare bande di rispetto dai corpi idrici come indicato in tabella.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** aglio, cipolla, porro, foglie di sedano, patata, cavoli di bruxelles, carota, olivo da olio, ciliegio e susino: 7 giorni; agrumi, mandorlo, frumento: 30 giorni. Altre colture: 3 giorni.

“ATTENZIONE” Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

<i>Colture</i>	<i>Banda di rispetto (metri)</i>
<b>Melo, pero</b> <i>Applicazioni precoci</i> <i>Applicazioni tardive</i>	20 -
<b>Drupacee, agrumi, fruttiferi a guscio, olivo</b> <i>Applicazioni precoci</i> <i>dose min</i> <i>dose max</i> <i>Applicazioni tardive</i>	20 20 -
<b>Vite</b> <i>Applicazioni precoci</i> <i>dose min</i> <i>dose max</i> <i>Applicazioni tardive</i> <i>dose min</i> <i>dose max</i>	5 10 10 20
<b>Cereali, ortaggi, patata, fragola, floreali ed ornamentali</b>	5